



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Приказ Минздравсоцразвития России от
30.05.2005 N 375

"Об утверждении стандарта профилактики
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 06.11.2015

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

30 мая 2005 г.

N 375

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ**

В соответствии с п. 5.2.14. Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1143; 1999, N 51, ст. 6289; 2000, N 49, ст. 4740; 2003, N 2, ст. 167; N 9 ст. 805; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить **стандарт** профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать **стандарт** профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку при оказании медицинской помощи.

Заместитель Министра
В.И.СТАРОДУБОВ

Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 30.05.2005 г. N 375

**СТАНДАРТ
ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ**

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Клиническая ситуация: профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности (с 28 недели беременности до родов)

Группа заболеваний: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека

Профильность подразделения, учреждения: женская консультация, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), сельская врачебная амбулатория (СВАО)

Функциональное назначение отделения: лечебно-профилактическое

**1.1. ПРОФИЛАКТИКА ИЗ РАСЧЕТА 11 НЕДЕЛЬ
(С 28 НЕДЕЛИ БЕРЕМЕННОСТИ ДО НАСТУПЛЕНИЯ РОДОВ)**

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
В01.014.01	Прием (осмотр,	1	1

	консультация) врача-инфекциониста, первичный		
A12.06.016	Серологические реакции на различные инфекции, вирусы	1	3
A13.30.003	Психологическая адаптация	1	4
A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	1	4
A09.05.019	Исследование уровня креатинина в крови	1	4
A09.05.021	Исследование уровня общего билирубина в крови	1	4
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови	0,1	4
A09.05.042	Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови	1	4
A12.06.001	Исследование популяции лимфоцитов (определение % содержания и абсолютного количества CD4 (+) -Т-лимфоцитов и CD8 (+) -Т-лимфоцитов)	1	4
B01.014.02	Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный	1	3

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа <*>	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД <***>	ЭКД <****>
Средства для лечения и профилактики инфекций			1		
	Противовирусные средства		1		
		Зидовудин	0,5	0,6 г	42,0 г
		Фосфазид	0,5	0,6 г	42,0 г
		Ламивудин	0,1	0,3 г	21,0 г
		Невирапин	0,1	0,4 г	28,0 г
		Нелфинавир	0,025	2,5 г	175,0 г
		Саквинавир	0,025	2,0 г	140,0

					г
		Ритонавир	0,025	0,2 г	14,0 г

<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<*> Ориентировочная дневная доза.

<***> Эквивалентная курсовая доза.

2. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Клиническая ситуация: профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности (при поступлении на роды и во время родов)

Группа заболеваний: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека

Профильность подразделения, учреждения: родильный дом (родильное отделение)

Функциональное назначение отделения: лечебно-профилактическое

2.1. ПРОФИЛАКТИКА (ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РОДЫ И ВО ВРЕМЯ РОДОВ)

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A12.06.016	Серологические реакции на различные инфекции, вирусы	0,3	1
A03.014.01	Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом иммунодефицита человека	0,3	1
A01.31.001	Сбор жалоб и анамнеза при инфекционном заболевании	0,3	1
A13.30.003	Психологическая адаптация	1	2
A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	0,3	2
A09.05.019	Исследование уровня креатинина в крови	1	1
A09.05.021	Исследование уровня общего билирубина в крови	1	1
A09.05.042	Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови	1	1

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа <*>	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД <*>	ЭКД <***>
Средства для лечения и профилактики инфекций			1		
	Противовирусные средства		1		

		Зидовудин	1	0,6	0,6
		Невиррапин	1	0,2 г	0,2 г
		Фосфазид	0,1	0,9 г	0,9 г

<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<*> Ориентировочная дневная доза.

<*> Эквивалентная курсовая доза.

Примечание: Кесарево сечение в плановом порядке на сроке беременности 38 недель (по показаниям).

3. Модель пациента

Категория возрастная: дети

Клиническая ситуация: профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности (после родов)

Группа заболеваний: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека

Профильность подразделения, учреждения: родильный дом (родильное отделение)

Функциональное назначение отделения: лечебно-профилактическое

3.1. ДИАГНОСТИКА

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
В01.014.01	Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный	1	1
А11.12.009	Взятие крови из периферической вены	1	1
А13.30.003	Психологическая адаптация <2>	1	1

3.2. ПРОФИЛАКТИКА У НОВОРОЖДЕННОГО С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ КОНТАКТОМ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ (НА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ - ДО 7 ДНЕЙ)

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
А09.05.017	Исследование уровня мочевины в крови	1	1
А09.05.020	Исследование уровня креатинина в крови	1	1
А09.05.042	Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови	0,8	1
А11.12.009	Взятие крови из периферической вены	0,8	1

A13.30.003	Психологическая адаптация	1	1
A25.31.003	Назначение лечебно-оздоровительного режима при неуточненном заболевании	1	1

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа <*>	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД <***>	ЭКД <****>
Средства для лечения и профилактики инфекций			1		
	Противовирусные средства		1		
		Зидовудин	1	0,035 г	0,19 г
		Невирапин	1	0,01 г	0,01 г

<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<***> Ориентировочная дневная доза.

<****> Эквивалентная курсовая доза.

4. Модель пациента

Категория возрастная: дети

Клиническая ситуации: профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности (после родов)

Группа заболеваний: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека

Профильность подразделения, учреждения: детская поликлиника (детское отделение), фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), сельская врачебная амбулатория (СВАО)

Функциональное назначение отделения: лечебно-профилактическое

4.1. ДИАГНОСТИКА

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
B02.031.01	Патронаж педиатрической сестры на дому	1	3
A01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	8
A01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	8
A01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	8
A01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	8

A01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	8
A02.01.001	Измерение массы тела	1	8
A02.03.002	Измерение окружности головы	1	8
A02.03.005	Измерение роста	1	8
A02.06.001	Измерения объема лимфоузлов	1	8
A02.31.001	Термометрия общая	1	8
B01.014.01	Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный	1	2
B04.014.01	Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста	1	2
A08.05.003	Исследование уровня эритроцитов в крови	1	4
A08.05.004	Исследование уровня лейкоцитов в крови	1	4
A08.05.005	Исследование уровня тромбоцитов в крови	1	4
A08.05.006	Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)	1	4
A12.05 001	Исследование оседания эритроцитов	0,3	4
A09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови	1	4
A09.05.010	Исследование уровня общего белка в крови	1	2
A09.05.011	Исследование уровня альбумина в крови	1	2
A09.05.014	Исследование уровня глобулиновых фракций в крови	1	2
A09.05.017	Исследование уровня мочевины в крови	1	3
A09.05.020	Исследование уровня креатинина в крови	1	3
A09.05.021	Исследование уровня общего	1	3

	билирубина в крови		
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови	1	3
A09.05.039	Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови	1	3
A09.05.041	Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови	1	3
A09.05.042	Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови	1	3
A09.05.045	Исследование уровня амилазы в крови	1	3
A09.05.046	Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови	1	3
A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	1	3
A12.06.016	Серологические реакции на различные инфекции, вирусы <*>	1	3
A13.30.003	Психологическая адаптация	1	8

<*> Определение антител к ВИЧ методом ИФА проводится, в возрасте 9, 12, при необходимости в 15 и 18 месяцев. Положительный результат подтверждается определением фракций антител к ВИЧ методом иммунного блота в возрасте 15 и 18 месяцев.

4.2. ПРОФИЛАКТИКА (ИЗ РАСЧЕТА 5 НЕДЕЛЬ)

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
B01.014.01	Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный	1	3
A02.03.002	Измерение окружности головы	1	2
A08.05.003	Исследование уровня эритроцитов в крови	0,8	2
A08.05.004	Исследование уровня лейкоцитов в крови	0,8	2
A08.05.005	Исследование уровня тромбоцитов в крови	0,8	2
A08.05.006	Соотношение лейкоцитов в	0,8	2

	крови (подсчет формулы крови)		
A09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови	0,8	2
A09.05.041	Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови	0,8	1
A09.05.042	Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови	0,8	1
A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	0,8	2
A13.30.003	Психологическая адаптация	1	2
A25.31.003	Назначение лечебно-оздоровительного режима при неуточненном заболевании	1	1

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа <*>	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД <*>	ЭКД <***>
Средства для лечения и профилактики инфекций			1		
	Противовирусные средства		1		
		Зидовудин	0,8	0,03 г	1,3 г

<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<*> Ориентировочная дневная доза.

<***> Эквивалентная курсовая доза.

Примечание: искусственное вскармливание.