

Не забывайте! И после удаления клеща, и после проведения профилактических мероприятий, нужно тщательно следить за своим здоровьем!

В течение 21 дня измеряйте температуру утром и вечером. Избегайте простуды, физического и умственного переутомления, не употребляйте алкогольные напитки.

При первом же недомогании, особенно при повышенной температуре, немедленно обратитесь к врачу.

Помните, что своевременное и правильное лечение, ранняя госпитализация - залог быстрого выздоровления.

ГБУ РМЭ «КЦСОН в Параньгинском районе»



Памятка

Клещ и клещевой энцефалит



пгт. Параньга

Что нужно знать о клещевом энцефалите

Иксодовый клещ – переносчик клещевого энцефалита – вирусной инфекции, поражающей нервную систему. Тяжелые осложнения острой инфекции могут завершиться параличом и летальным исходом.

Возбудителем болезни является вирус, который способен длительное время сохраняться при низких температурах и в высушенном состоянии. Но вирус быстро теряет активность при комнатной температуре, а кипячение убивает его в течение двух минут.

Для клещевого энцефалита характерна строгая весенне-летняя сезонность начала заболевания, связанная с сезонной активностью переносчиков.

Заболееваемость клещевым энцефалитом подвержена определенным колебаниям, что связано с колебаниями численности клещей, проведением профилактических мероприятий, интенсивностью посещения населением лесных угодий в периоды наибольшей численности иксодовых клещей (весна, начало лета).

Заражение клещевым энцефалитом происходит:

во время пребывания в лесу при попадании энцефалитного клеща на человека и укусе его;

клещей иногда приносят из леса в дом с верхней одеждой, букетами цветов, ягодами, грибами;

клещи могут быть занесены в жилище домашними животными;

возможно заражение клещевым вирусным энцефалитом при раздавливании клеща в процессе удаления его с животных или тела человека с последующим занесением вируса на слизистые оболочки глаз, носа, губ или на поврежденные участки кожи;

заражение возможно и при употреблении в пищу сырого молока, чаще, козьего. Это происходит потому, что козы, укушенные на пастбище клещами, сами заболевают и вирус клещевого энцефалита находится у них в крови и молоке.

4

При укусе клеща



Немедленно приступайте к его удалению.

(Тело клеща смажьте маслом или керосином и через 5 минут осторожно, раскачивая, удалите его. Если во время удаления случайно раздавили клеща - немедленно вымойте руки с мылом).

Обратитесь, как можно быстрее, в лечебное учреждение.

Госпитализация больных с подозрением на клещевой энцефалит проводится в неврологических отделениях больниц.